

## Program zaštite ljeske

vrijeme tretiranja fenofaza razvoja	bolesti i štetnici	sredstvo	koncentracija primjene	količina sredstva za 100 l vode
početak vegetacije (fenofaza pupanja)	bakterioze, jaja lisnih ušiju štitaste uši	<b>CRVENO ULJE</b>	2-3%	2-3 l
		ili <b>NORDOX 75 WG</b>	0,2%	200 g
		+ <b>BIJELO ULJE</b>	2%	2 l
početak svibnja	pjegavost, trulež ploda	<b>STOPER</b>	0,3%	300 ml
		ili <b>MANKOZEB</b>	0,25%	250 g
	ljeskotoč, lisne uši, grbice	<b>KING</b>	0,025%	25 ml
sredina svibnja	trulež plodova, pjegavost lista	ili <b>ASTRO</b>	0,05%	50 ml
		<b>STOPER</b>	0,3%	300 ml
	ili <b>MANKOZEB</b>	0,25%	250 g	
	ljeskotoč, stjenice ljeskova strizibuba grinje	<b>PIREL - D</b>	0,1%	100 ml
		<b>ORTUS 5 SC</b>	0,1%	100 ml
ili <b>KRAFT 18 EC*</b>		0,075%	75 ml	
krajem svibnja početak lipnja	trulež plodova, pepelnica	<b>TRAPEZ*</b>	0,04%	35 ml
	pjegavost lista	<b>STOPER</b>	0,25%	250 g
		ljeskotoč, stjenice	<b>PIREL - D</b>	0,1%
lipanj	trulež plodova	<b>CEZAR</b>	0,25%	250 ml
		<b>ZAGOR</b>	0,1%	100 ml
	ljeskotoč	ili <b>PIREL-D</b>	0,1%	100 ml
		ili <b>PIRIFOS EC</b>	0,1-0,15%	100-150
poslije berbe	bakterioze	<b>NORDOX 75 WG</b>	0,15%	150 g

\* prema registraciji i primjeni istovjetnih proizvoda u drugim zemljama u EU